

四庫全書

子部

# 欽定四庫全書

子部

外臺秘要方卷三十三

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官助教臣卜惟吉

謄錄監生臣汪存靖

欽定四庫全書

外臺秘要方卷三十三

唐 王燾 撰

求子法及方一十二首

千金論曰夫婦人之別有方者以其血氣不調胎妊生  
產崩傷之異故也是以婦人之病比之男子十倍難療  
經言婦人者衆陰所集常與濕居十四歲已上陰氣浮  
溢百想經心內傷五藏外損姿顏月水去留前後交互

瘀血停凝中道斷絕其中傷墮不可具論矣然五藏虛  
實交錯惡肉內漏氣脉損竭或飲食無度損傷非一或  
胎瘡未愈而合陰陽或行步風來便利於懸厠之上風  
從下入便成十二痼疾所以婦人別立方也若是四時  
節氣為病虛實冷熱為患者故與丈夫同也唯懷胎妊  
孕而挾病者避其毒藥耳其雜病與丈夫同則散在諸  
卷中可得而知也然而女人嗜欲多於丈夫感病倍於  
男子加以慈戀愛憎嫉妬憂患染著堅牢情不自抑所

以為病根深療之難差故養生之家特須教子女學此  
三卷婦人方令其精曉即於倉卒之秋何憂畏也夫四  
德者女子立身之樞機產育者婦人性命之長務若不  
通明於此則何以免其夭橫者哉故傳母之徒亦不可  
不學當宜繕寫一本懷挾隨身以防不意也

又論曰人之性情皆願賢已而疾不及人至於學問則  
隨情逐物墮於事業詎肯專一推求至理莫不虛棄光  
陰沒齒無益夫婚姻養育者人倫之本王化之基聖人

設教備論厥旨後生莫能精曉臨事之日昏爾若愚是則徒願賢已而疾不及人之謬也斯實不達賢已之趣而妄徇虛聲以終無用今具述求子之法以貽後嗣同志之士或可覽焉

又論曰夫欲求子者當先知夫妻本命五行相生及與德合并本命不在子休廢死墓中生者則求子必得若其本命五行相剋及與刑煞衝破并在子休廢死墓中生者則求子不可得慎無措意縱或得者於後終亦

累人若其相生并遇福德者仍須依法如方避諸禁忌則所誕兒子盡善盡美難以具陳矣禁忌法

凡欲要兒子生吉良者交會之日常避丙丁及弦望朔晦大風大雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地昏冥日月無光虹蜺地動日月薄蝕此時受胎非止百倍損於父母生子或瘡癰聾聵頑愚癲狂攣跛盲眇多病短壽不孝不仁又避日月火光星辰之下神廟佛寺之中井竈園廁之側塚墓屍柩之傍皆悉不可夫交會如法則有

福德大智善人降託胎中仍令父母性行調順所作和合家道日隆祥瑞競集若不如法則有薄福愚癡惡人來託胎中則令父母性行凶險所作不成家道日否殃咎屢至雖生成長家國滅亡夫禍福之驗有如影響此乃必然之理何不再思之

男女受胎時日法

凡男女受胎皆以婦人經絕一日三日五日為男仍遇男宿在貴宿日又以夜半後生氣時瀉精者有子皆男



必壽而賢明高爵也若以經絕後二日四日六日瀉精者有子皆女過六日皆不成子又遇王相日尤吉

推王相日法

春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸

推貴宿日法

正月一日六日九日十日十一日十二日十四日二十一日二十四日二十九日

二月四日七日八日九日十日十二日十四日十九日

二十二日二十七日

三月一日六日七日八日十日十七日二十日二十五

日

四月三日四日五日六日八日十日十五日十八日二

十二日二十八日

五月一日二日三日四日五日六日十二日十三日十

五日十六日二十日二十五日二十八日二十九日三

十日

六月一日三日十日十三日十八日二十三日二十六  
日二十七日二十八日二十九日

七月一日十一日十六日二十一日二十四日二十五  
日二十六日二十七日二十九日

八月五日八日十三日十八日二十一日二十二日二  
十三日二十四日二十五日二十六日

九月三日六日十一日十六日十九日二十日二十一  
日二十二日二十四日

十月一日四日九日十四日十七日十八日十九日二十日二十二日二十九日

十一月一日六日十一日十四日十五日十六日十七日十九日二十六日二十九日

十二月四日九日十二日十三日十四日十五日十七日二十四日二十七日

若春合甲寅乙卯 夏合丙午丁巳 秋合庚申辛酉  
冬合壬子癸亥

與上件月宿日合者尤佳

出第二卷中

千金翼論曰夫求子者服藥須有次第不得不知其次第謂男服七子散女服盪胞湯及坐藥并服紫石門冬丸則無不得效矣不知此者得力鮮焉其七子散盪胞湯紫石門冬丸  
出第五卷中在次下千金并翼方中

廣濟療無子令子宮內炙丸方

麝香

二分研

皂莢

十分塗酥炙削去黑皮子

蜀椒

六分汗

右三味搗篩蜜丸酸棗仁大以綿裹內產宮中留少

綿線出覺憎寒不淨下多即抽綿線出却丸藥一日  
一度換之無間晝夜皆內無所忌

又方

蛇牀子

石鹽

細辛

乾薑

土瓜根

各四兩

右五味搗散取如棗核大以綿裹內子宮中以指進  
之依前法中間病未可必不得近丈夫餘無所忌

並出

第三  
卷中

又療婦人百病斷絕緒產白薇丸方

白薇

細辛

厚朴

炙

椒

汗

桔梗

鼈甲

炙各五分

防風

大黃

附子

炮

石硫黃

各六分研

牡蒙

二分

人參

桑上寄生

各四分

半夏

洗

白殭蠶

續斷

秦艽

紫莞

杜仲

牛膝

蜚蠊

去翅足熬

水蛭

各二分

紫石英

研

朴硝

桂心

鍾乳

當歸

各八分

右二十七味搗篩蜜丸空腹溫酒服如梧桐子十五  
丸日二漸加至三十丸不吐不利忌生冷油膩飴生  
血物人莧生葱生菜猪肉冷水粘食陳臭出第二  
卷中  
千金七子散療丈夫風虛目暗精氣衰少無子補不足  
方

五味子

牡荊子

菟絲子

車前子

乾地黄

薯蕷

石斛

杜仲

鹿茸

炙

遠志

去心

新葶子

各八分

附子

炮



蛇牀子

芎藭

各六分

山茱萸

天雄

炮

黃芪

人參

茯苓

牛膝

各五分

桂心

十分

巴戟天

十二分

蓯蓉

七分

鍾乳

三分

右二十四味擣篩為散酒服方寸匕日二服不知增至二匕以知為度忌生冷酢滑猪雞魚蒜油膩不能酒者蜜和丸服亦佳行房法一依素女經女人月信斷一日為男二日為女三日為男四日為女已外無子仍每日午時前半夜後陽時為男下精欲得去玉

門入半寸不爾過子宮一方加覆盆子八分忌蕪荑

生葱

經心錄  
并翼同

又朴硝盪胞湯療婦人立身已來全不生及斷緒久不  
產三十年者方

朴硝

牡丹

當歸

大黃

桃仁

去皮尖生  
用合三兩

細辛

厚朴

炙

桔梗

芍藥

人參

茯苓

桂心

甘草

炙

牛膝

橘皮

各二兩

蜚蟲

去翅足  
微熱

水蛭

炙各六  
十枚

附子

一兩  
半炮

右十八味切以清酒五升水六升合煮取三升分四服日三夜一每服相去三辰少時更服如常覆被取少汗汗不出冬日著火籠必下積血及冷赤膿如赤小豆汁本為婦人子宮內有此惡物令然或天陰臍下痛或月水不調為有冷血不受胎若斟酌下盡氣力弱人困不堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得

藥力若能忍服盡大好一日後仍著導藥翼方無枯

梗甘草

並出第  
二卷中

千金翼坐導藥方

皂莢

一兩炙  
去皮子

大黃

戎鹽

礬石

燒

當歸

各二  
兩

五味子

乾薑

各三  
兩

細辛

三  
兩

蜀椒

汗二  
兩

葶藶子

苦瓠

各三分  
作山茱萸

右十一味擣篩內輕絹袋子如中指許大長三寸盛之令滿內子門中坐任意勿行走急小便時即出之

仍易新者一日當下青黃冷汁盡止即可幸御自  
有子若未見病出亦可至十日安之千金無葶藶一  
方又有砒霜三分廣濟同著藥後一日乃服紫石門冬  
丸其方如左

紫石英

七日研之

天門冬

各三兩去心

紫葳

甘草

炙

桂心

牡荊子

千金作牡蒙

烏頭

炮

乾地黄

辛夷仁

石斛

卷栢

禹餘糧

當歸

芎藭

各三兩

烏賊魚骨

牛膝

薯蕷

各六分

桑寄生

人參

牡丹皮

乾薑

厚朴

炙

續斷

食茱萸

細辛

各五分

柏子仁

一兩

右二十六味搗篩蜜和酒服十丸如梧桐子日三稍

加至三十丸慎如藥法

經心錄同并出第五卷中

延年療婦人子藏偏僻冷結無子坐藥方

蛇牀子

三兩

羌花

兩

右二味搗篩取棗大紗袋盛內產門中令沒指袋少

長便時須去任意卧著慎風冷

出第四卷中

久無子方五首

廣濟療久無子白薇丸方

白薇

牡蒙

藁本

各五分

當歸

乾地黄

各七分

芎藭

人參

柏子仁

石斛

桂心

附子

炮

五味子

防風

吳茱萸

甘草

炙

牛膝

桑寄生

各六分

薑黃

七分

禹餘糧

八分

秦椒

二分汗

右二十味搗篩蜜丸如梧桐子空腹酒下二十丸加至三十丸日再服不利忌生葱生菜熱麵蕎麥猪肉葵菜蕪荑菰菜海藻粘食陳臭物等

又療久無子斷緒少腹冷疼氣不調地黃湯方

乾地黃

牛膝

當歸

各八兩

芎藭

卷柏

防風

各六分

桂心

牽牛子末

各三分

右八味切以水六升煮取二升三合去滓分三服服



別和一分牽牛子末服如人行四五里更進一服以  
快利止忌熱麵蕎麥炙肉生葱薤葇蒜粘食等物

出第

三卷  
中

千金療月水不利關塞絕產十八年服此藥二十八日  
有子金城太守白薇丸方

白薇

細辛

各五分

人參

杜蘅

厚朴

炙

牡蒙

半夏

洗

白殭蠶

秦艽

當歸

紫苑

各三分

牛膝

沙參

乾薑

各三分

蜀椒

汗

附子

炮

防風

各六分

古今錄驗不用杜蘅用牡蠣三分熬

右十七味末之蜜和丸先食服如梧桐子三丸不知

稍增至四五丸此藥不可將服覺有身則止用大驗

忌錫豬羊肉冷水生葱生菜

崔氏延年同

有桔梗丹參各

三分

出第二卷中

千金翼白薇丸主久無子或斷緒上熱下冷百病皆療

之方

白薇

車前子

各三分

當歸

芎藭

蛇牀子

各四分

紫石英

菴藺子

石膏

藁本

卷柏

各五分

澤蘭

太一禹餘糧

糧

覆盆子

桃仁

熬

白芷

麥門冬

去心

人參

各六分

桂心

蒲黃

各十分

細辛

乾薑

乾地黄

椒

汗各十二分

茯苓

赤石脂

遠志

去心

白龍骨

各八分

分

橘皮

二分

右二十八味搗篩為末蜜和酒服十五丸如梧桐子  
日再增至四十丸以知為度亦可至五十丸慎豬雞  
魚蒜生冷酢滑生葱生菜蕪荑驢馬等肉覺有身則  
止藥祕之勿妄傳也

出第五  
卷中

經心錄茱萸丸療婦人陰寒十年無子方

吳茱萸

一升

蜀椒

一升去  
目汗末

右二味蜜丸如彈子丸綿裹導子腸中日再易無所  
下但開子藏令陰溫即有子也

出第六  
卷中

養胎法并禁忌一十三首

千金論曰舊說凡受胎三月逐物變化稟質未定故妊娠三月欲得觀犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子盛德大師觀禮樂鍾鼓俎豆軍旅陳設焚燒名香口誦詩書古今箴誡居處簡靜割不正不食席不正不坐彈琴瑟調心神和性情節嗜慾庶事清靜生子皆良長壽忠孝仁義聰慧無疾斯蓋文王胎教者也

又論曰兒在胎日月未滿陰陽未備府藏骨節皆未成

足故自初訖于將產飲食居處皆有禁忌

又妊娠食雞子及乾鯉魚令子多瘡

又妊娠食雞肉糯米令子多寸白蟲

又妊娠食雀肉并豆醬令子滿面斑黯黑子

又妊娠食山羊肉令子多病

又妊娠食兔犬肉令子無音聲并缺唇

又妊娠食驢馬肉延月

又妊娠食椹并鴨子令子倒出心寒

又妊娠食驪肉難產

又妊娠食雀肉飲酒令子心淫情亂不畏羞恥

又妊娠勿向非常之地大小便必半產殺人

又妊娠勿食羊肝令子多厄

又妊娠勿食蠶令兒短項

又妊娠食冰漿絕產

並出第二卷中

妊娠隨月數服藥及將息法一十九首

千金妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥

無食腥辛是謂才正

又妊娠一月足厥陰脈養不可鍼灸其經足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之時血行否澀不為力事寢必安靜無令恐懼

又妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服烏雌雞湯方

烏雌雞一隻

治如食法

茯苓

二兩

吳茱萸

一升

芍藥

白朮

各三兩

麥門冬

五合去心

人參

三兩



阿膠

二兩

甘草

一兩  
炙

生薑

一兩  
切

右十味切以水一斗二升煮雞取汁六升去雞下藥  
煮取三升內酒三升并膠烱盡取三升去滓溫服一  
升日三服

又若曾傷一月胎者當預服補胎湯方

細辛

一兩

防風

二兩

烏梅

一升

吳茱萸

五合

乾地黄

白朮

各一兩

大麥

五合

生薑

四兩

右八味切以水七升煮取二升半去滓分溫三服若

寒多者倍細辛茱萸若熱多渴者去細辛茱萸加栝  
樓根二兩若有所思去大麥加柏子仁三合忌生菜  
蕪荑桃李雀肉等物一方人參一兩

又妊娠二月名始膏無食辛臊居必靜處男子勿勞百  
節皆痛是謂胎始結

又妊娠二月足少陽脈養不可鍼灸其經足少陽內屬  
於膽膽主精二月之時兒精成於胞裏當慎護驚動  
又妊娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎卒

中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所下  
乍寒乍熱艾湯主之方

丹參

三兩

當歸

人參

麻黃

去節

艾葉

阿膠

炙各二兩

甘草

炙一兩

大棗

十二枚擘

生薑

一兩

右九味切以酒三升水一斗內藥煮減半去滓內膠  
煎取三升分溫三服忌海藻菰菜

又若曾傷二月胎者當預服黃連湯方

黃連

人參

各一兩

吳茱萸

五合

生地黄

五兩

生薑

三兩

右五味切以醋漿七升煮取三升分四服日三夜一  
每十日一作若頗覺不安加烏梅一升加烏梅者不  
用漿直用水耳忌猪肉冷水蕪荑一方當歸半兩  
又妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲  
生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉  
欲子賢良端坐清虛是謂外象而內感者也

又妊娠三月手心主脈養不可鍼灸其經手心主內屬於心無悲哀無思慮驚動

又妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤即黃卒驚恐憂愁嗔恚喜頓仆動於經脈腹滿繞臍苦痛腰背痛卒有所下雄雞湯方

雄雞

一隻治如食法

甘草

炙

人參

茯苓

阿膠

各二兩

黃芩

白朮

各一兩

麥門冬

去心

五合

芍藥

四兩

大棗

十二枚擘

生薑

一兩切

右十一味切以水一斗五升煮雞減半內藥煮取半  
內清酒三升并膠再煎取三升分三服一日盡之當  
溫卧忌海藻菰菜酢物桃李雀肉等  
一方當歸芍藥  
二兩不用黃芩

生薑

又若曾傷三月胎者當預服茯神湯方

茯神

丹參

龍骨

阿膠

當歸

甘草

人參

赤小豆

一粒

大棗

十三枚擘

炙

各二兩

十二

各一兩

右九味切酢漿一斗煮取三升分四服七日後服一

劑腰痛者加桑寄生二兩忌海藻松菜

深師有薤白二兩麻子一

升

又妊娠四月始受水精以成血脈宜食稻粳羹魚鴈是謂成血氣以通耳目而行經絡

又妊娠四月手少陽脈養不可鍼灸其經手少陽內輸三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食又妊娠四月為離經有寒心下溫溫欲嘔胃膈滿不欲

食有熱小便難數數如淋狀臍下苦急卒風寒頸項強痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胃心煩不得安卒有所下菊花湯方

菊花

如雞子大一枚

麥門冬

去心一升

麻黃

三兩去節

阿膠

三兩炙

甘草

二兩炙

當歸

二兩

人參

一兩半

生薑

五兩

半夏

二兩洗

大棗

十二枚擘

右十味以水八升煮減半內清酒三升并阿膠煎取三升分三服溫卧當汗以粉粉之護風寒四五日忌



羊肉海藻菰菜飴等

又若曾傷四月胎者當預服調中湯方

芍藥

四兩

甘草

炙

芎藭

續斷

各一兩

生李根白皮柴胡

白朮

各三兩

烏梅

一升

當歸

一兩半

生薑

四兩

厚朴

炙

枳實

炙各二兩

右十二味切以水一斗煮取三升分四服日三夜一

八日復服一劑一方半夏二兩忌海藻菰菜桃李雀

肉等物

又妊娠五月始受火精以成其氣卧必晏起沐浴浣衣  
深其居處厚其衣裳朝吸天光以避寒殃其食稻麥其  
羹牛羊和以茱萸調以五味是謂養氣以定五藏

又妊娠五月足太陰脈養不可鍼灸其經足太陰內輸  
於脾五月之時兒四肢成無大飢無甚飽無食乾燥無  
自炙熱無大勞倦

又妊娠五月毛髮初生有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦  
腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處

腹痛悶頓欲仆卒有所下阿膠湯方

又方旋覆花湯

阿膠

炙四兩

人參

一兩

麥門冬

一升去心

生薑

六兩

吳茱萸

旋覆花

當歸

芍藥

甘草

炙

黃芩

各二兩

右十味切以清酒三升以水九升煮減半內清酒三升并膠微火煎取三升半分四服日三服夜一先食再服便愈不差更服忌海藻菰菜

又若曾傷五月胎者當預服安中湯方

甘草

炙

芍藥

各三兩

當歸

人參

乾地黄

芎藭

各二兩

五味子

合五

麥門冬

去心

一升

大麻仁

合五

生薑

六兩

大棗

三十枚

擘

黃芩

一兩

右十二味切以水七升清酒五升煮取三升半分四服日三夜一七日復服一劑忌菰菜海藻蕪荑

又妊娠六月始受金精以成筋身欲微勞無得靜處出遊於野數觀走犬馬食宜鷙鳥猛獸之肉是謂變腠理

紉筋以養其力以堅背膂

又妊娠六月足陽明脈養不可鍼灸其經足陽明內屬於胃主其口目六月之時兒口目皆成調五味食甘美無大飽

又妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼麥冬湯方

麥門冬

去心  
一升

甘草

炙

人參

各一  
兩

乾地黄

三兩

黃芩

二兩

阿膠

四兩

生薑

六兩

大棗

十五  
枚擘

右八味切以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取  
三升分三服每服如人行三四里中間進糜粥忌海  
藻菰菜蕪荑

又若曾傷六月胎當預服柴胡湯方

柴胡

四兩

芍藥

一方作紫葢

白朮

甘草

炙各二兩

麥門冬

三兩去心

茯苓

一兩

芍藥

二兩

乾地黄

五兩

生薑

六兩

大棗

三十枚擘

右十味切以水一斗煮取三升分四服日三夜一中

間進糜粥勿食生冷及堅強之物七日更服一劑忌

海藻菰菜蕪荑桃李雀肉等

一方有黃  
芩二兩

又妊娠七月始受木精以成骨勞身搖肢無使定止動  
作屈伸以運血氣自此後居處必燥飲食避寒常食粳  
稻以密腠理是謂養骨而堅齒

又妊娠七月手太陰脈養不可鍼灸其經手太陰內屬  
於肺肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭  
無薄衣無洗浴無寒飲

又妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷服  
若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項腰背強葱白湯方

葱白

長三四寸  
十四枚

半夏

洗

麥門冬

去心

各一  
升

生薑

八兩

甘草

炙

當歸

黃芪

各三  
兩

阿膠

四兩

人參

一兩  
半

黃芩

一兩

旋復花

一把

右十一味切以水八升煮減半內清酒三升并膠煎  
取四升溫服一升日三夜一溫卧當汗出若不出者



加麻黃二兩煮服如前法若秋後勿強責汗忌羊肉  
飴海藻菰菜等

又若曾傷七月胎者當預服杏人湯方

杏仁

去雙仁  
皮尖

甘草

炙

鍾乳

研各  
二兩

麥門冬

去心

吳茱萸

各一  
兩

乾薑

二  
兩

五味子

粳米

各五  
合

紫菀

一  
兩

右九味切以水八升煮取三升半分四服日三夜一  
中間進食七日服一劑忌海藻菰菜

又妊娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極是謂密腠理光澤顏色

又妊娠八月手陽明脈養不可鍼灸其經手陽明內屬於大腸大腸主九竅八月之時兒九竅皆成無食燥物無輒失食無忍大起

又妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或使寒慄腰背苦冷痛而目視茫茫芍藥湯方

芍藥

四分

人參

當歸

甘草

炙各三兩

白朮

一兩

厚朴

炙二兩

薤白

切一升

生薑

四兩切

右八味切以水五升酒四升合煮取三升分三服日再夜一忌海藻菰菜桃李雀肉等

又若曾傷八月胎者當預服葵子湯方

甘草

炙三兩

芍藥

二兩一方四兩

柴胡

三兩

葵子

一升

白朮

三兩

生薑

六兩

大棗

二十枚擘

厚朴

二兩

右八味切以水九升煮取三升分三服日三十日服

一劑忌海藻菰菜桃李雀肉等

又妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備  
飲醲食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮多才力

又妊娠九月足少陰脈養不可鍼灸其經足少陰內屬  
於腎腎主續縷九月之時兒脈續縷皆成無處濕冷無  
著灸衣

又妊娠九月若卒下痢腹滿懸急胎上衝腰背痛不可  
轉側短氣半夏湯方

半夏

洗

麥門冬

去心各五合

乾薑

一兩

當歸

吳茱萸

阿膠

炙各三兩

大棗

十二枚擘

右七味切以水九升煮取三升去滓內白蜜八合微火上溫分四服痢即止忌生血物飴等

又若曾傷九月胎者當預服猪腎湯方

猪腎

一具

茯苓

桑寄生

乾薑

乾地黄

芎藭

各三兩

白朮

四兩

麥門冬

一升

去心

附子

中者一枚炮

大豆

三合

右十味切以水一斗煮腎令熟去腎內諸藥煎取三升半分四服日三夜一十日更一劑忌猪肉冷水蕪荑桃李雀肉酢物等

又妊娠十月五藏俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使關節人神皆備但俟時而生

集驗延年同並出第二卷中

小品療妊娠五月日舉動驚愕動胎不安下在小腹痛引腰脇

公洛切腋下也

小便疼下血安胎當歸湯方

當歸

阿膠

炙

芎藭

人參

各一兩

大棗

十二枚擘

艾

一虎口

右六味切以酒水各三升合煮取三升去滓內膠令

烱分三服腹中當小便緩差也

古今錄驗救急同出第七卷中

妊娠嘔吐及惡食方九首

集驗療婦人妊娠惡阻嘔吐不下食湯方

青竹茹

橘皮 各五兩

生薑

茯苓 各四兩

半夏

五兩湯洗

右五味切以水六升煮取二升半分三服不差頻作

忌羊肉錫酢物等

千金經心錄同

又療妊娠嘔吐不下食橘皮湯方

橘皮

竹茹

人參

白朮

各三兩

生薑

四兩

厚朴

炙二兩

右六味切以水七升煮取二升半分三服不差重作

忌桃李雀肉等

千金救急經心錄同出第十一卷中

古今錄驗療妊娠不欲食或吐春月所宜服柴胡湯方

甘草

炙

柴胡

各二兩

麻黃

一兩去節煎去沫



大棗

十二枚擘

食茱萸

一升

右五味切以水六升煮取三升適寒溫服一升日三  
療食噫醋除熱下氣多所宜與上同但春秋冬夏去  
茱萸加枸杞一斤六月加小麥一升石膏三兩秋去  
石膏加甘草一兩九月去麻黃加乾薑一兩十月加  
芎藭三分忌海藻菰菜

又療惡食人參湯方

人參

四兩

厚朴

炙

生薑

枳實

炙

甘草

炙各二兩

右五味切以水六升煮取三升分三服忌海藻松菜

並出第三

十四卷中

崔氏半夏茯苓湯療妊娠阻病心中憤悶空煩吐逆惡聞食氣頭眩重四肢百節疼煩沈重多卧少起惡寒汗出疲極黃瘦方

半夏

洗

生薑

各五兩

旋復花

一兩

橘皮

二兩

茯苓

二兩

細辛

芎藭

人參

桔梗

甘草

炙各二兩

芍藥

二兩

乾地黄

三兩

右十二味切以水一斗煮取三升分三服忌猪羊肉  
飴菰菜海藻生菜蕪荑

千金云若病阻積月日不得治及服藥冷熱失候病變  
客熱煩渴口生瘡者除橘皮細辛用前胡知母各二兩  
若變冷下痢者除乾地黄用桂心二兩若食少胃中虛  
生熱大便秘塞小便赤少者加大黃三兩除地黄加黃  
芩一兩餘依方服一劑得下後消息看氣力冷熱更增

損方調定更服一劑湯便急服茯苓丸令能食便強健也

又茯苓丸療妊娠阻病患心中煩悶頭眩重憎聞飲食氣便嘔逆吐悶顛倒四肢垂重不自勝持服之即效要先服半夏茯苓湯兩劑後可將服茯苓丸方

茯苓

人參

各一兩

桂心

熬

橘皮

白朮

甘草

炙

葛根

熬

乾薑

半夏

洗

枳實

炙各二兩

右十味搗篩蜜和丸如梧桐子大飲服二十丸漸至

三十九日三忌海藻菰菜羊肉飴桃李雀肉酢等

千金

同肘後只五味又云妊娠忌桂故  
然肘後不用乾薑半夏橘皮葛根

又療妊娠常苦煩悶此子煩也竹瀝湯方

竹瀝

三兩

防風

黃芩

麥門冬

去心

各三

兩

茯苓

四兩

右五味切以水四升合竹瀝煮取二升半分三服不

差重作忌酢物

又方

時時服竹瀝隨多少

出第十卷中

近效療妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐方

青竹茹

麥門冬

去心各三兩

前胡

二兩

陳橘皮

一兩炙令黃焦香氣出佳

蘆根

一握取肥白嫩者

右五味切以水二大升煮取半大升去滓分再服食

後一服無麥門冬用小麥三合煮之勿令裂即熟四

肢煩蒸者加地骨皮醫人夏侯極錄

妊娠胎動方九首

廣濟主安胎胎病漏肚痛方

當歸

芎藭

阿膠

炙

人參

各一兩

大棗

十二枚擘

右五味切以水三升酒四升合煮取二升半分三服

五日一劑頻服三四劑無所忌

出第三卷中

小品療妊娠重下痛引腰背安胎止痛湯方

當歸

阿膠

炙

乾地黄

黃連

芍藥

各一兩

雞子

一枚

秫米

一升

右七味切以水七升攪雞子令相得煮秫米令如蟹

目沸去滓內諸藥煮取三升分四服忌蕪荑

經心錄同

又膠艾湯療損動母去血腹痛方

阿膠

二兩

艾葉

二兩

右二味以水五升煮取二升半分三服

出第七卷中經心錄同

集驗療妊娠胎動不安腹痛葱白湯方

葱白

切一升

阿膠

炙

當歸

續斷



芎藭

各三兩

銀

隨多少

右六味切以水一斗先煮銀取七升去銀內餘藥煎

取二升半內膠令烱分三服不差更作千金同

又療妊娠二三月上至八月胎動不安腹痛已有所

見方

艾葉

阿膠炙

芎藭

當歸各三兩

甘草

一兩炙

右五味切以水八升煮取三升去滓內膠令烱分三

服日三

千金文仲  
備急同

又療妊娠六七月胎不安常處旋復花湯方

旋復花

一兩

厚朴

炙

白朮

枳實

炙

黃芩

茯苓

各三兩

半夏

洗十遍

芍藥

生薑

各二兩

右九味切以水一斗煮取二升半先食分五服日三

夜二忌羊肉餒醋桃李雀肉等

千金同出第  
十一卷中

刪繁療女人懷妊胎動不安葱豉安胎湯方

香豉

一升  
熬

蔥白

切一  
升

阿膠

二兩  
炙

右三味切以水三升煮二物取一升去滓下阿膠更

煎膠烱服一日一夕可服三四劑

出第七卷中  
經心錄同

文仲徐王效神驗胎動方

當歸

六分

芎藭

四分

右二味切以水四升酒三升半煮取三升分三服若

胎死即出比用神驗血上心腹滿者如湯沃雪

救急  
經心

錄同崔氏用米醋  
二升煎二十沸服

又安胎寄生湯療流下方

桑上寄生

五分白朮五分

茯苓

四分

甘草

十分炙

右四味切以水五升煮取二升半分三服若人壯者可加芍藥八分足水二升若胎不安腹痛端然有所見加乾薑四分即安忌海藻菰菜酢物桃李雀肉等

崔氏小品經心  
同出第七卷中

動胎腰腹痛方三首

廣濟療婦人妊娠動胎腰腹痛及血下方

當歸

三兩

葱白

切一升

芎藭

三兩

艾葉

二兩

鹿角膠

二兩炙

苧根

三兩

右六味切以銀汁一斗煮取三升絞取滓內膠上火膠烊分三服服別相去如人行六七里未好差停一

日更進一劑無所忌

出第三卷中

小品苧根湯療勞損動胎腹痛去血胎動向下方

苧根

乾地黄

各二兩

當歸

芍藥

阿膠

炙

甘草

炙各一兩

右六味切以水六升煮取二升去滓內膠烱分三服

忌海藻菰菜蘼蕪

出第七卷中

救急療妊娠動胎去血腰腹痛方

芎藭

阿膠

炙

當歸

青竹茹

各三

兩

右四味切以水一斗半煮銀二斤取六升去銀內藥

煎取二升半分三服日再夜一不差更作一劑

集驗千金

文仲古今錄驗備急經心錄同出第四卷中

頓仆胎動方四首

集驗療妊娠二三月上至七八月頓仆失踞胎動不安  
傷損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心短氣膠艾  
湯方

當歸

芍藥

甘草

炙

阿膠

炙

芍藥

各二兩

艾葉

三兩

乾地黄

四兩

右七味切以水五升好酒三升合煮取三升去滓內  
膠更上火令膠烺分三服日三不差更作忌海藻菘

萊蕪莢

丈仲同出第  
十一卷中

丈仲葛氏若由頓仆及舉重致胎動去血者方

擣黃連下篩酒服方寸匕日三愈血乃止忌猪肉冷

水等物

又方

赤小豆二升熬令香著雞子十四枚破內小豆中

更熬令黃黑末和酒服一匕日三服

又方



膠三兩  
炙

當歸二兩

甘草二兩  
炙

右三味切以水五升煮取二升分再服忌菰菜海藻

並出第  
七卷中

胎數傷及不長方三首

廣濟療婦人懷妊數傷胎方

鯉魚二斤 粳米一升

右二味如法作臠少著鹽勿著葱豉醋食之甚良一

月中頓三過作效安穩無忌

集驗文仲備急崔氏  
延年同出第三卷中

集驗療婦人懷胎不長方

鯉魚長一尺者水漬沒內鹽如棗煮令熟取汁稍  
稍飲之當胎所腹上當汗如鼻狀雖有所見胎雖  
不安者十餘日輒一作此令胎長大甚平安

出第十一

卷中

古今錄驗療妊娠養胎白朮散方

白朮

芎藭

各四分

蜀椒

三分汗

牡蠣

二分

右四味擣下篩酒服滿一錢匕日三夜一但苦痛加

芍藥心下毒痛倍加芎藭吐唾不能食飲加細辛一兩半夏大錢二十枚服之復更以醋漿水服之若嘔亦以醋漿水服之復不解者小麥汁服之已後其人若渴大麥粥服之病雖愈盡服之勿置忌桃李雀肉

等

裴伏張仲景方  
出第十一卷中

妊娠傷寒方四首

廣濟療妊娠傷寒頭痛壯熱支節煩疼方

前胡

知母

各三兩

石膏

五兩

大青

黃芩

梔子

各一兩

蔥白

切一升

右七味切以水七升煮取二升三合絞去滓分三服

服別相去如人行七八里再服不利忌熱麪羊肉集驗

文仲備急救急  
同出第三卷中

千金療妊娠傷寒方

葱白

莖十

生薑

切二兩

右二味以水三升煮取二升半頓服取汗

又方

鯽魚一頭燒作灰擣末酒服方寸匕取汗

並出第二卷中

救急療婦人妊娠十月若傷寒壯熱赤斑變為黑斑溺

血方

升麻

梔子仁

各四兩

大青

杏仁

去皮尖

黃芩

各三分

蔥白

切一升

右六味切以水六升煮取半分三服

出第四卷中

妊娠患瘡方二首

集驗療妊娠患瘡湯方

常山

二兩

甘草

炙一兩

黃芩

三兩

烏梅

十四枚擘

石膏

八兩

右五味切以水一升半合漬藥一宿煮三四沸去滓

初服六合次服四合後服二合凡三服忌海藻菰菜

生葱

千金救急古  
今錄驗同

千金妊娠患瘡方

常山

竹葉

各三兩

石膏

八兩碎

糯米

一百粒

右四味切以水六升煮取二升半去滓分三服第一

服未發前一食久服之第二服取臨欲發餘一服用  
塗頭額及胃前五心藥滓置頭邊當一日勿進水及  
進飲食過發後乃進飲粥忌生葱菜

集驗文仲備急  
同出第二卷中

妊娠下痢方四首

千金療妊娠下痢方

白楊皮一斤以水一大升煮取二小升分三服

又妊娠及產已寒熱下痢方

黃連

一升

梔子

二十枚擘

黃蘗

一斤

右三味切以水五升漬一宿煮三沸服一升一日一

夜令盡嘔者加橘皮一把生薑二兩

翼同並出  
第二卷中

文仲療妊娠下痢不止方

黃蘗

乾薑

赤石脂

各二兩

石榴皮

一具

右四味切以水八升煮取二升分三服

出第七  
卷中

古今錄驗療妊娠下痢方

酸石榴皮 黃芩

人參

各三兩

櫟皮

四兩

粳米

三合



右五味切以水七升煮取二升半分三服

千金經心錄同出第

三十四  
卷中

妊娠心痛方九首

千金療妊娠心痛方

青竹筍

一升

羊脂

八兩

白蜜

三兩

右三味合煎食前頓服如棗核大三枚日三服

又方

蜜一升和井底泥泥心下

又方

青竹皮一升酒二升煮三沸頓服之

又方

破雞子一枚和酒服之

又方

麻子三升水八升煮取五升分三服

又方

橘皮

三兩

豉

二兩

右二味搗為丸如梧桐子服二七丸

又方

燒牛屎焦末水服方寸匕日三

並出第二卷中

文仲葛氏療妊娠卒胎上迫心痛方

取弩弦急帶之立愈

出第七卷中

古今錄驗療妊娠卒得心痛欲死术湯方

白术

六兩

黄芩

三兩

芍藥

四兩

右三味切以水六升煮取二升半分三服半日令盡

微下水令易生忌桃李雀肉

出第三十  
四卷中

妊娠腹痛方三首

千金療妊娠腹中痛方

生地黃三斤擣絞取汁酒一升合煎減半頓服

又方

燒車釭脂末內酒中服又服一升蜜良

並出第  
二卷中

古今錄驗療妊娠腹痛或是冷痛或是胎動葱白當歸湯方

葱白

一虎口

當歸

三兩

右二味切以水酒共五升煮取二升分再服亦將小

便服相去一炊頃

出第三十卷中

妊娠漏胞方五首

小品療妊娠數月日猶經水時時來者名曰漏胞若因房室勞有所去名曰傷胎視說要知如此小豆散療數傷胎將用之方

赤小豆五升濕地種之令生牙乾之

右一物下篩懷身數月日經水尚來以溫酒服方寸

七日三得效便停

千金救急經心錄  
同出第七卷中

集驗妊娠血下不止名曰漏胞血盡子死方

雞子十四枚取黃以好酒二升煮使如飴一服之

又方

生地黄汁一升酒四合合煮三四沸頓服之不止

頻服

救急千金文仲備急古今錄驗  
經心錄同並出第十一卷中

崔氏療妊娠漏胞方

乾地黄

四兩

乾薑

二兩

右二味搗篩酒服方寸匕日再服

集驗文仲  
經心錄同

又方

乾地黄搗末以三指撮酒服之不過三服甚良

千金

同並出第

十卷中

妊娠下血及尿血方五首

千金療妊娠卒下血方

葵子

一斗

右一味以酒五升煮取二升分三服差

又方

生艾葉

一升

右一味以酒五升煮取二升分三服冬用莖

又方

生地黄

切一升

右一味以酒四升煮取二升分三服亦療落身後血

又方



燒秤錘令赤內酒中沸定取出飲之

又方

葵根莖燒作灰以酒服方寸七日三

並出第二卷中

文仲療妊娠下血方

取黍膏燒末服一七日三

出第七卷中千金云黍莖

古今錄驗療妊娠下血豆醬散方

豆醬二升漉去汁熬令燥末酒服方寸七日五六

服

出第三十四卷中

妊娠小便不通利方五首

千金療妊娠小便不通方

蕪青子七合搗為末水和方寸匕服日三

出第二卷中

千金翼療妊娠小便不利方

葵子

一升

榆白皮

一把

右二味以水五升煮五沸服一升日三服

千金同

又方

葵子

茯苓

各一兩

右二味為散水服方寸七日三小便利止

千金同並出第五卷

中

古今錄驗療妊娠卒不得小便方

杏仁

二十枚去皮尖熬令變色

右一味搗服如大豆大七枚立得利

又療妊娠不得小便方

滑石水和泥臍二寸

並出第三十四卷中

妊娠子淋方五首

小品療妊娠患子淋宜下地膚大黃湯

地膚草

大黃

各三兩

知母

黃芩

茯苓

一作猪苓

芍藥

枳實

炙

升麻

通草

甘草

炙各二兩

右十味切以水八升煮取三升分三服得下後淋不

好差還飲地膚葵根汁忌海藻菰菜酢物

又方

猪苓

五兩

右一味擣篩以白湯三合和方寸匕為一服漸至二

七日三夜二盡不差宜轉下之服甘遂散

出第七卷中甘遂散

在後大小  
便不利中

千金療妊娠患子淋方

葵子一升以水三升煮取二升分再服

經心  
錄同

又方

葵根一把水三升煮取二升分再服

出第二  
卷中

經心錄療妊娠患子淋小便數出少或熱痛酸疼及足

腫地膚飲方

地膚草三兩以水四升煮取二升半分三服日三

夜一劑

文仲小品同  
出第六卷中

妊娠大小便不利方五首

小品療妊娠子淋大小便並不利氣急已服猪苓散不  
差宜服甘遂散下之方

太山赤皮甘遂

二兩

右一味搗篩以白蜜二合和服如大豆粒多覺心下

煩得微下者日一服之下後還將猪苓散不得下日

再服漸加可至半錢匕以微下為度中間將猪苓散

黃蘗寄生湯在療子淋方中

經心錄同出第七卷中子淋方中唯有猪苓散

無黃蘗寄生湯

古今錄驗療妊娠得病六七日以上身熱入藏大小便不利安胎除熱葵子湯方

葵子

二升

滑石

四兩碎

右二味以水五升煮取一升盡服須臾當下便愈

出第

二十四

卷中

妊娠子癇方二首

小品療妊娠忽悶眼不識人須更醒醒復發亦仍不醒者名為瘧病亦號子癇病亦號子冒葛根湯若有竹近可速辦者當先作瀝汁後辦湯也其竹遠不可即辦者當先辦湯此二療會得其一種其竹瀝偏療諸瘧絕起死也非但偏療妊娠產婦絕死者有效小兒忽癇瘧金瘡療之亦驗作竹瀝法



取新伐青淡竹斷之除兩頭節留中央一節作片  
以塼並側令竹兩頭虛布列其上燒中央兩頭汁  
出以器承之取服

又主瘧冒葛根湯療妊娠臨月因發風瘧忽悶憤不識  
人吐逆眩倒小醒復發名為子癇病方

貝母

葛根

丹皮

去心

木防已

防風

當歸

芎藭

桂肉

熬切

茯苓

澤瀉

甘草

炙各二兩

獨活

石膏

碎

人參

各三兩

右十四味切以水九升煮取三升分二服貝母令人

易產若未臨月者升麻代之忌海藻菰菜酢

並出第七卷中

妊娠水氣方三首

集驗療婦人妊娠手脚皆水腫攣急方

赤豆

五升

商陸根

一斤切

一方加澤漆

一斤

右三味以水三斗煮取一斗常稍稍飲之盡更作

千金

同出第十

一卷中

千金療妊娠腹大胎間有水氣生魚湯方

生鯉魚

二斤

生薑

五兩

白朮

三兩

芍藥

當歸

各三兩

茯苓

四兩

右六味切以水一斗二升煮魚熟澄清取八升內藥

取三升分三服忌桃李雀肉酢物等

集驗同出  
第二卷中

崔氏療妊娠體腫有水氣心腹急滿湯方

茯苓

白朮

各四兩

旋復花

二兩

杏仁

去皮尖

黃芩

各三兩

右五味切以水七升煮取二升半分二服飲之忌桃

李雀肉酢物等

千金救急古今錄驗  
集驗同出第十卷中

損娠方六首

廣濟療婦人因損娠下血不止方

當歸

白龍骨

乾地黄

各八分

地榆

阿膠

芍藥

乾薑

各六分

熟艾

四分

牛角鰓

十分炙  
令黃

蒲黃

五分

右十味搗篩為散空腹以飲服方寸七日二服漸加

至二七差止不吐利忌生冷油膩猪魚蒜蕪荑

出第三卷

中

千金落娠胎墮下血不止方

丹參

十二兩

右一味切以酒五升煮取三升分三服

集驗文仲備急同出第二

卷中

又方

地黄汁和代赭末服方寸匕

又方

桑螵蟲屎燒酒服方寸匕

並出第四卷中

救急療損娠方

取朱砂末一錢匕生雞子三顆打取白和朱砂頓

服胎若死即出如未死即安

出第五卷中

古今錄驗療婦人墮娠血不盡來去喜煩滿鹿角屑豉

湯方

鹿角

一兩屑熬

香豉

一升半

右二味以水三升煮令三沸漉去滓然後內鹿角屑攪令調頓服須臾血下

出第三十七卷中

數墮胎方四首

刪繁療婦人懷胎數落而不結實或寒冷熱百病之源黃耆散方

黃芪

吳茱萸

乾薑

人參

甘草

炙

芎藭

白朮

當歸

乾地黄

各二兩

右九味擣散清酒服一匕半日再服加至兩匕為劑

忌海藻菰菜蕪荑桃李雀肉等

經心錄同出  
第七卷中

千金療妊娠數墮胎方

妊娠三月灸膝下一寸七壯

又方

赤小豆末酒服方寸匕日二亦主妊娠數月月水

尚來者

並出第  
三卷中

經心錄紫石門冬丸主風冷在子宮有子常落或始為



婦便患心痛乃成心疾月水都未曾來服之肥悅令人  
有子方

遠志

去心

澤瀉

肉蓯蓉

桂心

各二兩

紫石英

天門冬

去心

五味子

三兩

禹餘糧

蜀椒

汗

烏頭

炮

卷柏

烏賊骨

寄生

石楠

當歸

各一兩

杜仲

甘草

炙

石斛

柏子仁

辛夷

人參

各二兩

雲母

一兩燒

右二十二味末之以蜜丸酒服二十丸如梧桐子稍加至三十四丸日三忌海藻菰菜猪肉冷水生葱

鯉魚

千金同出  
第六卷中

妊娠得病欲去子方三首

小品療妊娠得病事須去胎方

通按麥芽神曲墮胎如神凡有孕者不可妄用

麥蘖一升末和煮二升服之即下神效

又方

七月七日法麴三升煮兩沸宿不食旦頓服即下

並出第

二卷中

文仲療姙娠得病欲去胎方

取雞子一枚以三指撮鹽置雞子中服之立出

此與

阮河南療產難  
同出第七卷中

○肘後千金  
經心錄同

落胎去胎方四首

廣濟療落胎方

枯樓

四兩

桂心

五兩

牛膝

三兩

瞿麥

二兩

右四味切以水七升煎取二升三合去滓分三服服

别如人行八九里進之無忌

又方

取牛膝六七莖綿纏槌頭令碎深内至子宮頭忌

生葱猪牛肉

並出第三卷中

小品療羸人欲去胎方

甘草

炙

乾薑

人參

芎藭

生薑

桂心

蟹爪

黄芩

各一兩

右八味切以水七升煮取二升分三服忌海藻松菜

生葱

出第七  
卷中

千金欲去胎方

大麴五升清酒一升煮三沸去滓令盡分五服當

宿勿食旦再服其子如糜令母肥盛無疾苦千金

不傳

出第三  
卷中

產乳序論三首

崔氏夫人生壽夭雖有定分中間枉橫豈能全免若調攝會理或可致長生若將護乖方乃胎乳傷促且中人

之性識異弘遠言及產育情多鄙之都未知此道幽深博施處廣僕褰帷之暇頗敦經史逮乎藥術彌復關懷今歷選羣方兼申短思苟非切要詎能載錄晚述職孤城空莊四絕尋醫訪道理闕多疑豈得坐而相守以俟其斃此書所記故緣於此蓋擬備諸私室未敢貽厥將來必有以為要亦所不隱也余因披閱巒公調氣方中見巒公北平陽道慶者其一妹二女並皆產死有兒婦臨月情用憂慮入山尋余請覓滑胎方余報言少來多

遊山林未經料理此事然當為思量或應可解慶停一宿余輒憶想畜生之類緣何不聞有產死者姪女偷生賤婢獨產亦未聞有產死者此當由無人逼佐得盡其分理耳其產死者多是富貴家聚居女婦輩當由兒始轉時覺痛便相告報傍人擾擾令其驚怖驚怖畜結生理不和和氣一亂痛切唯甚傍人見其痛甚便謂至時或有約髻者或有力腹者或有冷水溪面者努力強推兒便暴出畜聚之氣一時奔下不止便致運絕更非佗

緣至且以此意語慶慶領受無所聞然猶苦見邀向家  
乃更與相隨停其家十餘日日晡時見報云兒婦腹痛  
似是產候余便教屏除牀案遍一房地布草三四處懸  
繩繫木作衡度高下令得蹲當腋得憑當衡下敷慢氈  
恐兒落草悞傷之如此布置訖令產者入位語之坐卧  
任意為其說方法各有分理順之則全逆之則死安心  
氣勿怖強此產亦解人語語訖閉戶戶外安牀余共慶  
坐不令一人得入時時隔戶問之何似答言小痛可忍



至一更令爛煮自死牝雞取汁作粳米粥粥熟急手攪  
使渾渾適寒溫勸令食三升許至五更將末便自產聞  
兒啼聲始聽人入產者自若安穩不異云小小痛來便  
放體長吐氣痛即止蓋任分和氣之效也慶問何故須  
食雞肉汁粥答云牝雞性滑而濡庶使氣滑故耳問何  
不與肉答云氣將下恐肉不卒消為妨問何故與粥答  
云若飢則氣上氣下則速產理不欲令氣上故耳慶以  
此為產術之妙所傳之處無不安也故知巒公隱思妙

符神理然則日遊反支之類復何豫哉但以婦人怯弱  
臨產驚遽若不導以諸法多恐志氣不安所以簡諸家  
方法備題如左其間取捨各任量裁凡婦人產難必須  
先簡此書推所投月日知犯忌各須豫慎不得犯之其  
次應須帳幕皮醋藏衣等物之類並早經營入月即須  
使足若不豫備臨急用逮事必致闕唯舊經事者始達  
此言豫備不虞古之善教也

又凡產者雖是穢惡然將痛之時及未產已產皆不得

令死喪污穢家人來視之必產難若已產者則傷子  
又凡產法唯須熟忍不得逼迫要須兒痛欲出然後抱  
腰傍人不得驚擾浪作形勢但此事巒公法中已經商  
畧無用師巫妄述已能橫相牽挽失其本性今故重述  
特宜防也

崔氏年立成圖法一首

女人年十三

行年在庚申反支在正月七月禍害在南  
方離絕命在東南巽生氣在西南坤宜喚

西南黃衣師看產產婦宜著黃衣卧西南  
首懸尸在辰戌日閉肚在辛八壯在申

女人年十四

行年在己亥反支在八月二月禍害在西南坤絕命在西南兌生氣在南方離宜喚

南方赤衣師看產產婦著赤衣卧南首

懸尸在卯酉日閉肚在壬八壯在癸

女人年十五

行年在戊午反支在三月九月禍害在西北乾絕命在東北艮生氣在北方坎宜喚

北方黑衣師看產產婦宜著黑衣卧北

首懸尸在寅申日閉肚在癸八壯在壬

女人年十六

行年在丁巳反支在四月十月禍害在東艮絕命在西北乾生氣在東方震宜喚

東方青衣師看產產婦宜著青衣卧東

首懸尸在丑未日閉肚在申八壯在辛

女人年十七

行年在丙辰反支在五月十一月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮宜

喚東北黃衣師看產產婦宜著黃衣卧東

北首懸尸在子午日閉肚在乙八壯在庚

女人年十八

行年在乙卯反支在六月十二月禍害在北方坎絕命在東方震生氣在西北乾宜

喚西北方黑衣師看產產婦宜著黑衣卧西  
北首懸尸在己亥日閉肚在丙八壯在丁

女人年十九

行年在甲寅反支在正月七月禍害在東南巽絕命在南方離生氣在西方兌宜喚

西方白衣師看產產婦宜著白衣卧西  
首懸尸在辰戌日閉肚在丁八壯在丙

女人年二十

行年在癸丑反支在二月八月禍害在西方兌絕命在西南坤生氣在東南巽宜喚

東南方青衣師看產產婦宜著青衣卧東  
南首懸尸在卯酉日閉肚在庚八壯在乙

女人年二十一

行年在壬子反支在三月九月禍害在南方離絕命在東南巽生氣在西南坤

宜喚西南方黃衣師看產產婦宜著黃衣卧  
西南首懸尸在寅申日閉肚在辛八壯在甲

女人年二十二

行年在辛亥反支在四月十月禍害在西南坤絕命在西方兌生氣在南方離

宜喚南方赤衣師看產產婦宜著赤衣卧  
南首懸尸在丑未日閉肚在壬八壯在癸

女人年二十三

行年在庚戌反支在五月十一月禍害在西北乾絕命在東北艮生氣在北方

坎宜喚北方黑衣師看產產婦宜著黑衣卧  
北首懸尸在子午日閉肚在癸八壯在壬

女人年二十四

行年在巳酉反支在六月十二月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣東方震

宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣卧  
東首懸尸在巳亥日閉肚在甲八壯在辛

女人年二十五

行年在戊申反支在正月七月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮

宜喚東北黃衣師看產產婦著黃衣卧東  
北首懸尸在辰戌日閉肚在乙八壯在庚

女人年二十六

行年在丁未反支在二月八月禍害在北方坎絕命在東方震生氣在西北乾

宜喚西北方白衣師看產產婦宜著白衣卧西北首懸尸在卯酉日閉肚在丙八壯在丁

女人年二十七

行年在丙午反支在三月九月禍害在東南巽絕命在南方離生氣在西方兌

宜喚西方白衣師看產產婦宜著白衣卧西首懸尸在寅申日閉肚在丁八壯在丙

女人年二十八

行年在乙巳反支在四月十月禍害在西方兌絕命在西南坤生氣在東南巽

宜喚東南青衣師看產產婦宜著青衣卧東南首懸尸在丑未日閉肚在庚八壯在乙

女人年二十九

行年在甲辰反支在五月十一月禍害在南方離絕命在東南巽生氣在西南

坤宜喚西南黃衣師看產產婦宜著黃衣卧西南首懸尸在子午日閉肚在辛八壯在甲

女人年三十

行年在癸卯反支在六月十二月禍害在西南坤絕命在西方兌生氣在南方離宜

喚南方赤衣師看產產婦宜著赤衣卧南首懸尸在巳亥日閉肚在壬八壯在癸

女人年三十一

行年在壬寅反支在正月七月禍害在西北乾絕命在東北艮生氣在北方坎

宜喚北方黑衣師看產產婦宜著黑衣卧北首懸尸在辰戌日閉肚在癸八壯在壬

女人年三十二

行年在辛丑反支在二月八月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方震

宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣卧東首懸尸在卯酉日閉肚在甲八壯在辛

女人年三十三

行年在庚子反支在三月九月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮

宜喚東北黃衣師看產產婦宜著黃衣卧東北首懸尸在寅申日閉肚在乙八壯在庚



女人年三十四

行年在乙亥反支在四月十月禍害在北方坎絕命在東方震生氣在西北乾

宜喚西北白衣師看產產婦宜著白衣卧西  
北首懸尸在丑未日閉肚在丙八壯在丁

女人年三十五

行年在戊戌反支在五月十一月禍害在東南巽絕命在南方離生氣在西方

兌宜喚西方白衣師看產產婦宜著白衣卧  
西首懸尸在子午日閉肚在丁八壯在丙

女人年三十六

行年在丁酉反支在六月十二月禍害在西方兌絕命在西南坤生氣在東南

巽宜喚東南方青衣師看產產婦宜著青衣卧  
東南首懸尸在巳亥日閉肚在庚八壯在乙

女人年三十七

行年在丙申反支在正月七月禍害在南方離絕命在東南巽生氣在西南坤

宜喚西南方黃衣師看產產婦宜著黃衣卧  
西南首懸尸在辰戌日閉肚在辛八壯在甲

女人年三十八

行年在乙未反支在三月八月禍害在西南坤絕命在西方兌生氣在南方離

宜喚南方赤衣師看產產婦宜著赤衣卧  
南首懸尸在卯酉日閉肚在壬八壯在癸

女人年三十九

行年在甲午反支在三月九月禍害在西北乾絕命在東北艮生氣在北方坎

宜喚北方黑衣師看產產婦宜著黑衣卧  
北首懸尸在寅申日閉肚在癸八壯在壬

女人年四十

行年在癸巳反支在四月十月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方震宜喚

東方青衣師看產產婦宜著青衣卧東  
首懸尸在丑未日閉肚在甲八壯在辛

女人年四十一

行年在壬辰反支在五月十一月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方

震宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣卧  
東首懸尸在子午日閉肚在乙八壯在庚

女人年四十二

行年在辛卯反支在六月十二月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北

艮宜喚東北黃衣師看產產婦宜著黃衣卧東北首懸尸在巳亥日閉肚在丙八壯在丁

女人年四十三

行年在庚寅反支在正月七月禍害在北方坎絕命在東方震生氣在西北乾

宜喚西北方白衣師看產產婦宜著白衣卧西北首懸尸在辰戌日閉肚在丁八壯在丙

女人年四十四

行年在己丑反支在二月八月禍害在東南巽絕命在南方離生氣在西方兌

宜喚西方白衣師看產產婦宜著白衣卧西首懸尸在卯酉日閉肚在庚八壯在乙

女人年四十五

行年在戊子反支在三月九月禍害在西方兌絕命在西南坤生氣在東南巽

宜喚東南方青衣師看產產婦宜著青衣卧東南首懸尸在寅申日閉肚在申八壯在甲

女人年四十六

行年在丁亥反支在四月十月禍害在南方離絕命在東南巽生氣在西南坤

宜喚西南方黃衣師看產產婦宜著黃衣卧西南首懸尸在丑未日閉肚在壬八壯在癸

女人年四十七

行年在丙戌反支在五月十一月禍害在西南坤絕命在西方兌生氣在南方

離宜喚南方赤衣師看產產婦宜著赤衣卧南首懸尸在子午日閉肚在癸八壯在壬

女人年四十八

行年在乙酉反支在六月十二月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方

震宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣卧東首懸尸在己亥日閉肚在甲八壯在辛

女人年四十九

行年在甲申反支在正月七月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮

宜喚東北方黃衣師看產產婦宜著黃衣卧東北首懸尸在辰戌日閉肚在乙八壯在庚

凡禍害絕命上產婦不可向之大小便又不得向產犯者凶產後血不止

凡生氣之上宜產婦向之坐令兒長壽母子俱吉

凡閉肚之上臨月及已產未滿月皆不得向其處大小便及棄不淨水犯者令人閉塞難產失顏色腹痛面痿黃令臍絞痛咽喉不利凶

凡八壯之地產婦廬帳門不得向之開又不得於其處產令閉塞難產大凶

凡運鬼力士犯者令產婦運悶至欲產日宜解袋口即  
易產吉

凡反支月不得使血露汚地或令子死腹中或產不順  
皆須先布灰草然後敷馬驢牛皮於其上產吉

凡懸尸之日不可攀繩宜懸馬轡攀之吉

凡行年本命相俱坐轡轡吉

十二月立成法一首

並圖

正月三月五月七月九月十一月福德在丙壬

二月四月六月八月十月十二月福德在甲庚

夫人臨產必須避諸凶神逐月空福德之地若神在外  
於舍內產若在內於舍外產令於當福德及空地為產  
帳其舍內福德處亦依帳法





如木  
大影  
大影  
大影

吳時  
豐隆

天  
猴  
狗

未丁午丙巳

南

申庚安產婦帳言

酉酉征虎

戌井大夫

乾  
運  
馬  
力  
七

亥雷公月白虎

壬子軒轅大時

癸丑咸池

寅  
北

東

辰

卯招搖

甲一云安產帳

壬戌  
 亥大夫  
 子月白虎狂虎  
 丑癸  
 寅天樵  
 卯甲  
 辰乙招搖  
 巳未丁午丙巳  
 午未丁午丙巳  
 未丁午丙巳  
 申雷公  
 酉軒轅大時  
 戌成淵豐隆吳時  
 乾兌

[illegible]





用无翅刀

申招摇雷公

庚

和

井

成

乾

亥雷公

壬藏衣吉一云安產婦帳

子軒轅大時一云狂虎

癸

丑豐隆吳時

北

七月空  
在丙士

在丙士

學

未丁午丙

招徠

安産日天猴

婦帳一云藏衣言

藝

辰

乙

卵

由

每

月白虎

月白虎二云夫

寅大夫一云天狗

五、謝賜力



天樞  
申庚酉辛戌  
招搖  
北  
亥  
子  
壬  
地  
藏  
衣  
吉  
天  
狗  
癸  
丑  
寅  
甲  
寅  
雷  
公  
辰  
乙  
卯  
軒  
轅  
大  
時  
辰  
威  
迎  
豐  
隆  
吳  
時  
南  
九月  
空  
在  
丙  
壬  
東  
未  
丁  
午  
丙  
巳  
祭  
月  
地  
大  
白  
安  
夫  
虎  
產  
狂  
婦  
虎  
帳





子出西門  
申雷公曰白虎  
庚酉軒轅大時  
辛戌成迎是時豐隆  
北  
亥壬子藏衣吉  
子招攝  
癸丑  
寅天猴天狗  
甲辰  
乙卯東  
在丙土  
十一月空  
南  
未丁午丙巳  
未大天  
地安產婦  
辰大德藏衣

時大轉軒  
 未丁午丙巳  
 咸池  
 申大夫  
 庚地藏木吉  
 酉月白虎狂虎  
 戌  
 乾  
 亥天猴  
 壬子  
 北  
 癸丑招搖吳時豐隆  
 寅  
 甲地安產婦帳  
 乙卯天狗  
 辰  
 紫微鬼力士  
 雷公

大時招搖咸池吳時雷公豐隆軒轅月白虎大夫狂虎  
天候天狗運鬼力士等十三神日別具注如圖產婦犯  
之大凶宜依月空處坐吉其兒衣亦依天德月空之處  
藏之吉但臨產及未滿月皆不得在懸尸閉肚之上小  
便亦不得棄浣衣不淨水慎之仍不得以雜物弊其上

推日遊法一首

# 日遊圖



常以癸巳日入內宮一十六日至巳酉日出癸巳甲午  
乙未丙申丁酉在紫微北宮

戊戌己亥庚子辛丑壬寅在南宮

癸卯一日在天廟西宮

甲辰乙巳丙午丁未戊申在御女東宮

右日遊在內產婦宜在外別於月空處安帳產吉

己酉庚戌辛亥壬子癸丑甲寅在外東北維

乙卯丙辰丁巳戊午己未在外東方

庚申辛酉壬戌癸亥甲子乙丑在外東南維

丙寅丁卯戊辰巳巳庚午在外南方

辛未壬申癸酉甲戌乙亥丙子在外西南維

丁丑戊寅巳卯庚辰辛巳在外西方

壬午癸未甲申乙酉丙戌丁亥在外西北維

戊子巳丑庚寅辛卯壬辰在外北方

右日遊在外宜在內產吉凡日遊所在內外方可

向之產凶

體玄子為產婦借地法一首

東借十步

西借十步

南借十步

北借十步

上借十步

下借十步

辟方之中摠借四十餘步此中產婦安居無所妨礙無所畏忌諸神擁護百鬼速去急急如律令

右借法及所投月即寫一本貼著產婦所居正中北壁上更不須避日遊反支及諸神等此頻用有驗故錄耳



日歷法二首

甲子日

在內面向東北  
西南二角吉

乙丑日

在內面向西南  
西北三角吉

丙寅日

在內面向西南  
西北二角吉

丁卯日

在內面向西南  
西北二角吉

戊辰日

在內面向西南  
西北二角吉

己巳日

在內面向西北  
東北二角吉

庚午日

在內面向西北  
東北二角吉

辛未日

在內面向西北  
東北三角吉

壬申日

在內面向東南  
東北二角吉

癸酉日

在內面向東北  
北東南三角吉

甲戌日

在內面向東南  
西南二角吉

乙亥日

在內面向東北  
西南二角吉

丙子日

在內面向西南  
東北二角吉

丁丑日

在內面向西南  
北東南三角吉

戊寅日

在外面面向西北  
西南二角吉

己卯日

在外面面向東南西  
西北三角吉

庚辰日

在里面面向東北  
西北二角吉

辛巳日

在里面面向西北西  
南東北三角吉

壬午日

在里面面向西南  
東北二角吉

癸未日

在里面面向東南  
東北二角吉

甲申日

在里面面向東南  
西北二角吉

乙酉日

在里面面向東南西  
北東北三角吉

丙戌日

在里面面向東北  
西南二角吉

丁亥日

在里面面向東北西  
南東南三角吉

戊子日

在里面面向西南  
東北二角吉

己丑日

在里面面向東南西  
南西北三角吉

庚寅日

在里面面向東南  
西北二角吉

辛卯日

在里面面向東南  
西北二角吉

壬辰日

在里面面向西南  
東北二角吉

癸巳日

在外面面向西南東  
北西北三角吉

甲午日

在外面面向西南  
西北二角吉

乙未日

在外面面向東南西  
北東北三角吉

丙申日

在外面面向西北  
東北二角吉

丁酉日

在外面面向西北東  
南東北三角吉

戊戌日

在外面面向東北  
西南二角吉

己亥日

在外面面向東北東  
南西南三角吉

庚子日

在外面面向東南  
東北二角吉

辛丑日

在外面面向東南西  
北西南三角吉

壬寅日

在外面面向東南  
西南二角吉

癸卯日

在外面面向東南西  
南西北三角吉

甲辰日

在外面面向西南  
西北二角吉

乙巳日

在外面面向西北西  
南東北三角吉

丙午日

在外面面向西南東  
北西北三角吉

丁未日

在外面面向西北東  
南東北三角吉

戊申日

在外面面向西北  
東北二角吉

己酉日

在外面面向東南西  
北東北三角吉

庚戌日

在外面向東北  
東南二角吉

辛亥日

在內面向東南  
西南二角吉

壬子日

在內面向東南  
北西南三角吉

癸丑日

在內面向東南  
西南二角吉

甲寅日

在內面向東南  
西北二角吉

乙卯日

在內面向東南  
西北三角吉

丙辰日

在內面向西南  
北東北三角吉

丁巳日

在內面向西南  
北東北三角吉

戊午日

在外面向西南  
北東北三角吉

己未日

在外面向東北  
南東北三角吉

庚申日

在內面向西北  
南東北三角吉

辛酉日

在內面向東北  
南東北三角吉

壬戌日

在內面向東南  
西北二角吉

癸亥日

在內面向西南  
東北二角吉

凡日歷十二辰並有神殺禁忌不可向產日別須簡看

凡甲乙日

生子勿著白衣宜著黑衣吉卧無西首勿庚辛日起

丙丁日

生子勿著黑衣宜著

青衣卧無北首勿壬癸日起

戊己日

生子勿著青衣宜著赤衣卧無東首勿甲乙日起

庚辛日

生子勿著赤衣宜著

黃衣卧無南首勿丙丁日起

壬癸日

生子勿著黃衣宜著白衣卧無四角首勿戊己日起

### 安置產婦法二首

凡欲產時先以朱砂點產婦項後宛宛中又點鼻孔間柱兩傍宛宛中牛穿据處即向產處呪之曰此地空閑

安居產婦某姓就此吉處諸神擁護百鬼速去莫相觸  
忤三呪之訖即燒火於產處四方以井華水四器亦置  
產處四方各橫刀於水上其刀浮磨拭之又法捉一刀  
子先向產處呪曰一尺刀子七寸刃拒以反支而治運  
如此三呪訖釘刀子著產處地上然後坐產

已上並出  
第十上卷

中

產難方二十四首

崔氏凡婦人產難死生之候母面赤舌青者兒死母活

母面赤舌赤口中沫出者母死兒活母唇口青口兩邊

沫出者母子俱死

文仲同出第十上卷中

廣濟療難產三日不出者方

取死鼠頭燒作屑并花水服

千金崔氏救急同

又方

槐子十四枚蒲黃一合內酒中溫服須臾不生更

服之

千金集驗崔氏同

又方

吞生雞子黃三枚并少苦酒

崔氏集驗備急文仲同

又方

吞皂莢子二枚亦效

千金崔氏小品同並出第三卷中

小品療產難歷日氣力乏盡不能得生此是宿有病方

赤小豆

二升

阿膠

二兩

右二味以水九升煮豆令熟取汁內膠令烊一服五

合不覺不過再即產

崔氏千金同

又方



取馬銜一枚覺痛即令左手持之

崔氏同

又方

取槐東引枝手把之

崔氏同

又方

手捉鷓鴣頭甚驗

崔氏同並出第七卷中

集驗若日月未至而欲產者方

末知母蜜和兔屎大服一丸痛不止更一丸

千金崔氏

小品同

又方

取夫衣帶五寸燒作灰酒服立下

崔氏廣濟文仲同並出第七卷

中

備急療難產方

取槐子吞三枚

崔氏同

又方

取鑿柄入孔裏者燒末酒服之立下

崔氏同

又方

弓弦三寸箭筈二寸各燒末酒服之

崔氏同

又方

取羚羊角屑燒末酒服之

千金崔氏同

又若母已死兒子不出方

但以水銀如彈丸格口內喉中捧起令下食頃又

捧令起子便落

崔氏同

又方

擣蒲根絞取汁一二升灌口中此亦治母生子死

驗

崔氏同

又療母子俱死者產難及胎不動轉者方

榆白皮

三兩

葵子

五合

甘草

炙

桂心

各一兩

右四味切以水四升煮取二升服一升須臾不產更

服一升忌海藻菰菜生葱

崔氏小品同

又產難數日欲絕秘方

書奏作兩行字凡二十字文日帝乙生子司命勿

止即出其胞及其子無病其母封其中央以朱印

之令產婦持之

崔氏小品同

又產難六七日母困方

取好膠二兩清酒一升半微火烱膠內新雞卵一

枚鹽一寸匕相和頓服即產不產更服

崔氏同

又產難母如死不知人事方

用陳葵子末三指撮酒服口噤者去齒下藥即愈

立驗

崔氏同

又療婦人產難方

書紙曰坐為蒲卧為魚女屬母兒屬夫急急如律令即產婦吞之又書兩道兩手各執一凡書三本

崔氏同並出  
第一卷中

救急療產難方

取廁前用草二七枚燒作屑服之

千金崔氏同崔氏云日用籌

又方

取牛屎中大豆書一片作入字一片作出字還合

吞之良

崔氏同並出  
第四卷中

千金療難產方

令夫唾婦口中二七過立下

集驗崔氏同  
出第十卷中

逆產方一十二首

小品療逆產方

鹽塗兒足底又可急搔爪之并以鹽摩產婦腹上

即愈

崔氏千金  
集驗同

又方

鹽和粉塗兒兩足下即順矣

千金崔氏同

又方

又彈丸二枚擣末三指撮溫酒服

集驗千金崔氏同並出第七卷

中

集驗療逆產方

燒錢令赤內酒中飲之

崔氏同

又方

夫陰毛二七枚燒以猪膏和丸如大豆吞兒手即

持丸出神驗

千金崔氏同



又方

朱書左足下作千字右足下作黑字

崔氏同

又方

生不出手足先見燒蛇脫皮末服刀圭亦云三指

撮面向東酒服即順

崔氏千金同

又方

真丹刀圭塗兒腋下

崔氏同

又方

以手中指取釜底黑煤交畫兒足下順出

千金文仲崔氏

備急同並出  
第十一卷中

刪繁療逆產難產數日不出者方

取桃仁中破書一片作可字一片作出字還合吞

之崔氏  
同

又療逆產方

取車肚中膏畫腋下及掌心

崔氏文仲備急小品千金集驗同

又療逆產胞衣不出方

取竈屋上黑塵酒服之

千金崔氏同並  
出第七卷中

橫產方四首

小品療橫產及側或手足先出方

可持麤鍼刺兒手足入二分許兒得痛驚轉即縮

自當迴順

文仲備急千金  
崔氏集驗同

集驗療橫生方

取梁上塵三指撮酒服之

千金文仲崔氏  
同出第十一卷

文仲療縱橫不可出

用菟絲子末酒若米汁服方寸匕即出車前子亦

好服如上法

千金崔氏同

又方

服水銀如大豆一枚

備急崔氏同

右以前橫產逆產二條條流雖別療法蓋同可以意  
量逐善參用也

子死腹中欲令出方一十五首

集驗療子死腹中方

真珠二兩酒服盡立出

崔氏同

又方

取竈下黃土三指撮酒服之立出當著兒頭上

千金

崔氏文

仲同

又療胎死在腹方

取三家雞卵各一枚三家鹽各一撮三家水各一

升合煮令產婦面東向飲之立出

千金備急  
崔氏同

又方

取瞿麥一斤以水八升煮取二升分再服不出更

服

文仲千金  
崔氏同

又方

葵子一升阿膠五兩水五升煮取二升頓服出閤

日又服

崔氏千金文仲備急  
同並出第十一卷中

崔氏療子胎在腹中恐死不下方

當歸

芎藭

各二兩

右二味以好醪醋二升煮藥二十沸頓服之若胎已

死即下如胎未死即便安穩也

又療子死腹中又妊兩兒一兒活一兒死令腹中死者  
出生者安此方神驗萬不失一

蟹爪

一升

甘草

二尺炙切

阿膠

三兩炙

右三味以東流水一斗先煮二味取三升去滓內膠  
令烺頓服不能頓服分再服若人困絞口下藥入即

汗煎藥宜東向竈以茅葦薪煮之

集驗廣濟千金  
備急文仲同

又療妊身熱病子死腹中又出之方

烏頭

一枚

右一味細擣水三升煮取大二升稍稍摩臍下至陰下胎當立出

又方

以苦酒濃煮大豆一服一升死兒立下不能頓服

再服之亦得

千金同

又療子胎在腹內已死方

甘草

一尺炙

蒲黃

合

筒桂

四寸

香豉

二升



雞子

一枚

右五味切以水六升煮取一升頓服胎胞穢惡盡去

大良

千金集驗同並  
出第十卷中

丈仲療或半生胎不下或子死腹中或半著脊及在草  
不產血氣上蓋心母面無顏色氣欲絕方

猪膏

一升煎

白蜜

一升

淳酒

二升

右三味合煎取二升分再服不能隨所能服之

備急  
刪繁

千金崔

氏同

又子死腹中不出方

以牛屎塗母腹上立出

備急崔氏千金同

又方

榆皮

切一兩

珍珠

一兩

右二味以苦酒三升煮取一升頓服死兒立出

集驗千金

備急崔氏同並出第二卷中

救急療子死腹中方

服水銀三兩立出集驗

千金備急文仲小品同

又方

取夫尿二升煮令沸飲之集驗

千金崔氏同並出第四卷中

胞衣不出方二十首

廣濟療胞衣不出方

末竈突中土三指撮以水服之

集驗千金備急文仲同

又方

取夫單衣蓋井上立出

千金集驗救急崔氏小品同

又療胞衣不出方

取苦酒服赤米一兩

千金集驗  
崔氏同

又方

雞子一枚苦酒一合和飲之即出

集驗千金  
崔氏同

又方

當戶燒黍穰即出

崔氏同並出  
第二卷中

小品療胞衣不出方

取皂莢擣末著鼻孔中嚏即出

崔氏同

又方

鹿角末三指撮酒服之

崔氏同

又方

兒衣不出吞此符吉

麗

延年療婦人傷娠及胎死腹中胞衣不出產後疾病及諸困竭欲死方

刺取羊血及熱飲之不能者人含吐與之能多益

善若不能咽噉少鹽又水湔其面此方神驗

崔氏文仲

備急

同

又胞衣不出方

以洗兒水服半杯即出

崔氏同

又療胞衣不出腹中滿則殺人方

但多服猪膏又大豆一升苦酒一斗煮取三升分

三服

崔氏同

又方

吞雞子黃兩三枚解髮刺喉中令得嘔即出若困極死者以水一升煮栝樓一枚三兩沸寫口中汁

下即出

出第十四卷中崔氏云水一升煮螻蛄一枚三沸服

救急療胞衣不出并兒橫到死腹中母氣欲絕方

半夏

二兩洗

白斂

二兩

右二味搗篩服方寸匕小難一服橫生二服到生三

服兒死四服亦可加代赭瞿麥各二兩

廣濟集驗小品備急文仲

崔氏

同

又方

小豆小麥相和濃煮汁飲之立出

小品千金備急崔氏同

又療胞衣不出方

取炊簞當戶前燒之

廣濟集驗千金崔氏同出第四卷中

必效療胞衣不出令胞爛牛膝湯方

牛膝

四兩

滑石

八兩

當歸

三兩

通草

六兩

葵子

一升

瞿麥

四兩

右六味切以水九升煮取三升分三服忌牛狗肉

廣濟

集驗千金崔氏同  
通草一方作莽草

又方



服蒲黃如棗大良

集驗千金  
崔氏同

又方

生男吞小豆七枚生女吞二七枚

千金崔氏並同

又方

生地黃汁一升苦酒三合煖服之不能頓服再服

之

集驗千金  
崔氏同

又方

澤蘭葉

三兩

滑石

五兩  
屑

生麻油

二合

右三味以水一升半煮澤蘭取七合去滓內滑石生

麻油頓服

廣濟集驗千金崔氏同並出第四卷中

厲

幽

鬼

已上三符主產難產婦吞之吉

厲

產難燒此符和服之吉

厲

逆產橫產吞此符

右出崔

氏產書

外臺秘要方卷三十三